Observations sur quelques Varietée des Etranglemants, & des sacs ~~[illegible]~~ dans les hernies Inguinalles; par monsieur aurran: lües a la cademie Le 7 juillet 1768.

n.° 30.

1re observation, qui a pour objet, une hernie occationée par la rupture du peritoine, suitte d'un Effort employé pour aler a la selle: l'intestin se trouvant Etranglé dans le point precis de la rupture de cette membrane.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Le nommé Conrad soldat au regiment d'alsace fut amené le 3 9bre 1764. a l'hôpital militaire de Strasbourg, se pleignant de douleurs qu'il avoit au bas ventre, avec un peu de tention a cette capacité; il avoit de frequentes Envie de vomir, la peau Etoit legerement Enflammée sur la region du testicule droit, & de son cordon, qui avoit acquis le volume du petit doigt d'un adulte. le malade se pleignait surtout d'une douleur vive dans la region de l'anau du muscle oblique Externe, & dans celle de l'estomach: son pouls Etoit frequent & tendu, le malade Interrogé a dit que quinzes jours avant son Entrée a l'hopital, allant a la selle avec Effort, il avoit tout a coup senti un picottement dans l'anau musculeux du coté droit, & se picottement ne l'ayant pas Empeché pendant huit jours de vivre—

ARC 15d.24 n°2

d'eau devie, devin, mengeant le Veilliant la proportion:
le picottement ayant augmenté, il s'etoit trouvé forcé
de se rendre a l'hopital; Le 3e jour de son cejour
en celieu, il fut pris des lematin d'un Vomissement
de matieres Stercoralles delayé, le bas ventre n'etoit
pas plus tendû qu'au commencement. Le 6e jour c'est
metheorisé & le malade a vomi derechef des Excremants:
alors tout à Eté demal en pis jusqu'au 7e. tems
ou mr. Leriche chirurgien major du lieu, c'est permis
de faire lexamain des parties, apres avoir invité plusieurs
personnes de l'art à cet Examain; son avis à Eté, que
la cause de ses accidents, ne pouvoit dependre que d'un
Volvulus, ou de l'inflammation du testicule, touts les
consultents onts Eté de son avis, Excepté l'autheur
de ses observations, qui tacittement (apres lexamain fait
du malade) prononça, ou inclinà avec lui même pour un
Etranglement de quelque unes des parties contenuës dans
le bas ventre sorties hors de cette capacité. le malade
Est, mort sans secours convenables, la maladie n'ayant pas Eté
reconnuë, quoi qu'il me semble que le diagnostic fut Evident;
je je crois être fondé à le croire, d'apres le detail que
l'on fait a l'academie, de cequi c'est trouvé a l'ouverture
du cadavre; Scavoir une rupture au peritome, qui permetoit
La sortie, d'une portion d'intestin formant l'anse, de
pres d'un pouce, & s'engageant dans le Commencement

delaguaine Vaginale : aladurface Interne de Cette —
manbramme, une portion dumezantaire absolument adherente
aladirconferance dedarupture (qui serencontract aquelques
lignes audessus dubord Inferieur delaponevrose du
muscle transverse) Enfin lexamain delautheur, qui la
conduit (lemalade Existant) areconnoître une Elevation
qui Etoit molle depuis laine Jusqu'à pres desix lignes
audessus du muscle oblique Externe, ou alors il
rencontrat une seconde tumeur, semblable à une petite
Vessie cachée sous plusieurs lammes de parties molles.
Letout Examiné, Je pense que cette observation, quoi que
non admise par leplus grand nombre des praticiens,
qui nyant la possibilité delarupture du peritoine
(comme cause determinant lahernie) Jecrois dige
qu'avec dautre faits amallogues, Lacademie pourá
constater un corps dedoctrine, sur cet objet, qui
nest pas trop connû Enchirurgie ; dailleures letat
ou se sont trouvée les Intestins et lestomach
Vont approuver que lautheur nesetoit pas Eloigné
du Vrai, dans son diagnostique, et que —
laccident du testicule, netoit qu'un Effet —
secondaire.

2de observation d'une hernie, avec deux sacs et un Etranglement hors, de la capacité du ventre.

Le nommé Jacque philipe Chiquet, agé de 65 ans, tottier de son metier, Est venu à l'hotel dieu de Rouen Le 24 Janvier 1767, avec une hernie dans Laîne droite, qui S'etendoit depuis Lanau jusqu'au fond des bources. Cette maladie resemblait, à un gros et court [redacted] cilendre, Elle Etoit môle et flasque, dans plus de sa moitié Superieure: mais tendue ovâle, transparente et fort douloureuse, avec un peu d'inflammation à sa partie Inferieure; Lanau du muscle oblique Externe de ce côté Etoit fort dillaté (tellement dit Lauteur) que J'i introduisis un doigt en y poussant Les teguments. on distinguait facilement que les parties Echapée Etoients fort à leur aise, tant dans Lanau, que dans toutte la partie superieure de Cette tumeur, le malade Etoit abbatu, Il vomissait de tems en tems et Les nosées Etoients frequentes: le ventre Etoit serré depuis plusieurs Jours, (Contre son ordinaire) Il netoit cependant ni Sensible, ni tendu. on Jugea que la partie Inferieure de cette tumeur Etoit une hydrocelle; on resta suspendu

sur la Cause des accidents. le malade mourut sans secours
Chirurgicaux, quoi que le diagnostic fut Evident des
deux maladies: lesquelles reunies formoient une
Complication, qui auroit du determiner à faire
ce qui fut fait (au raport de palphin) en cas à peu
pres semblable, par feu Mr. marechal en 1694. alors
Chirurgien en Chef de la charité; Il commença
par ouvrir le scrotum, Il en sortit beaucoup d'Eau, en
continua son operation en ouvrant la gaine
vaginale, dans laquelle Il trouva, une portion
de piploon fletrie; ayant employé à cet Egard
les ressources de l'art, le malade guerit ~~[illegible]~~
Mr Aurran continüe, le dit quayant fait l'ouverture
du Cadavre, Il a trouvé que la hernie Etoit formée par
l'intestin, ileum, et que celui ci Etoit contenu dans
deux sacs placée l'un sur l'autre, comme si Ils
Etoients bout à bout: l'enterocelle Etoit simple
superieurement, mais Elle Etoit compliquée Inferieurement
par une hydrocelle, de sorte que, à peu pres
six pouces d'intestin, trois onces de serosité et le
corps du testicule Etoients renfermées dans le
sac Inferieur. l'ouverture du Cadavre, à

Confirme un fait peu connu; lorceque le premier sac ou strictement parlant le sac hernière c'est trouvé percé dans sa partie inferieure, au terme de laisser echaper l'intestin, qui ayant affranchi la resistance qu'offre la tunique vaginalle, au point de son voisinage avec le epididime, c'est trouvé confondu avec le testicule lui même. Je crois que la piece anathomique meritte d'être transmise a la posterité: en gravant les deux sacs ouverts, de maniere que l'on puise voir l'ouverture du sac hernière qui à permis a l'intestin, d'affranchir l'ouverture du sac inferieur, pour se confondre avec le testicule.

2.e Observation: hernies avec deux sacs l'un renfermé dans l'autre.

Le nommé Laurant martin agé de 40 ans ~~[illegible]~~, vaint à l'hotel Dieu de Rouen, le 21 Janvier 1767 avec une hernie ancienne mais Etranglée depuis deux jours; Elle Etoit dans l'aine droite ou Elle formoit une tumeur Egalle a la tête d'un foetus. Le Malade ressentait de vives douleurs dans la descente, proche de l'anau oblique externe, il n'allait point a la selle, il avoit le hoquiet, il

Il vomissait des matières puantes; le lendemain matin on lui fit L'operation du bubonocelle : les teguments communs ayants Eté ouverts, un sac grisatre et solide se presenta le premier, on L'ouvrit, et il en sortit de L'eau avec Impetuosité. les parties contenues se presentairents sous la forme d'une tumeur oblongue, flotante dans le sac presedent et sans auqune adherance avec lui; on dillata L'anau, on Esseya de reduire Le tout a la fois : mais les premieres tentatives Etants Infructueuses, mr. david qui operait n'incista pas : et L'ouverture du second sac fut fait de L'avis de mr. Le Cat, alors L'intestin parut a decouvert, et il sortit autant de serosité, qu'a L'ouverture du premier sac ce sac Etoit adherent a touttes les parties voisinnes, sa surface Interne Etoit lisse et polie, les deux surfaces de L'autre Etoients Egallement polies; mr. david me dit alors que L'adherance du duxieme sac a L'anau, avoit fait toutte La difficultté qui s'etoit opposée a la reduction de L'attumeur contenue; La malade aquieri de cette operation.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Dans cette derniere observation, auqu'euns signes d'hydrocelles ne c'est manifesté avant l'operation ; je ne vois rien dont l'academie puise tirer d'aventages : les choses s'étant pratiquée celon les régles de l'art, a l'occation d'une hernie complette engagee dans la guaine vaginalle. quant a l'eau qui est sortie, a la suitte de l'ouverture de chaque sac ; je doute qu'on puise regarder ses évacuations comme suitte necessaire d'hydrocelles : les hernies anciennes, en raison d'accidents qui determinents a l'operation, ayants leurs sacs communement remplis d'eau, en asse grande quantité.

Ce jeudy 28 juillet 1768 Frigard de ...